dimpodizatordaninehudurd Immonlanti

Doight du neigne

Vass4R04s081-085

0Mtp311



Collection Vassal-Montpellier

Doight du neigne feulle ders 1-2 et 3





DESIGNATION : Doight du neigne CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6 Vigueur : 3 PORT : (rig) - 1/2 érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison : 10,8 Date de Naturité : 12-9-17 Pourriture : 0 GRAPPE : G - P : C BAIR : TG - G- H - P disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 5 avec pépins - apyrène s3 0 JUS : inc. - coloré , SAS

Doight du neigne in DUSIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 6 (1.1.2.3) Vigueur : 2 PORT : (érig - (2 éris - couché Millerandage : 0. Date de Véraison : 5.8 Date de Maturité : 16:981 Pourriture ig O GRAPPE : G - N - P : L - N - C BAIE: TG - G - N - P 24020 defrime life

disc. - Sph. - ell. - Ov.
Obover cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 3, si 0 s2 3 avec pépins - apyrène 83 O JUS - coloré

Année:

4-746

Emplacement ... Désignation Doight du neigne

!	! ! !	Nombre		DATES							
1	!	Total d'yeux	103		<u> </u>	<u> </u>					
!	1	4	8	1 1	I.	!!!!!					
1	2	4	2	1	1						
1	3	4	1	1	1	2.72 *					
1	4 7			1	1	pe10.3.72 =					
1	5 1			1	!	()					

Année: 1977 Emplacement ... 4.7 Ab. 112-3 Désignation / Doight du neigne

	! Nombre ! Total	DATES							
	! d'yeux	7.3	10.3						
1	; H	@ 4 x	!!!		1 1				
2	14	1	3 x !	ple	9-3-17 +3				
3	6	0	2						
×	!								
5	!		!!!						

	Nombre Total		D A	TES					
	d'yeux!	133!	1	!	!	!			
1	: 2	2 . !	I 1	!	!	!			
2	1 9 !	٤. !	! !	!	i	1			
3	16 1	3 - !	!	i I	!	1			
#	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	1	!!	!			
9	! !	!	! !	1	!	!			
	a different regional regional common common de descripción de desc		DA	2 33	3 78				

NOM Doight du Neigne EMPLACEMENT 4 R4 181.85

Souche	Nbre	Débourren	ent Nbre	Ferti-	Flor	caison			raison		
	yeux	début mi/	deb grap	lite	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité
1	2	•	0								
2	4		. 0								
3	4	; ;	0	Grappe	: G	M - P	Dim	¢ o.	Compac	cité	: L - M- C
4	f.			Pour :		Mil.	_				
5	4	-		Baie:				Dim: bov-cyl	-fus		
		<u> </u>	i :	Couleur	r : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	đus :	inc -	- col	loré
	1	Į.		Saveur	: s	m - a:	r - f	ox - he	erb		
1	E			Pépins	avec	- ap	yrène				
1		1 •		Port :			V	igueur	•		
		* !									
	l i		:								

ANNEE: 4996 UDM Doight du neigne EMPLACEMENT. 4 R4 184,85

ne	•												
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrament mi/déb	19bre grap	Ferti-	Flor	mi/E	f j.n		aison mi/v	fin	Maturité	
1	972	15.3	25,3*	0									
2	V3		18.3.										
3	.4	11,3	18.31	0	Grappe	: G -	M - P	Dim	:	Compac	cité	: L - 1=	(
4	2	A CO	18.31	0	Four :	W! - C	Mil: - 11	and the same	Dim:				
5	2				-				bov-cyl	-fus			
												1.0	

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

ANUEL: 1997

HOM Daight du neigne MATLACHERT 4R4 181-85.

		ni										
iche	Nbre yeux		rrement mi/d@b		Ferti- lité		raison mi/E		V6: debut	raison mi/v	Lin	naturil.é
1 2 TL 3 4 5 TL	4 13 8 4 13.			0 0 1	Four : Baie : Couleu Saveur	: G - O TG - dlsc-s	M P MII D - M sphrel Gr-Rs- m - a	Dim 1 : 0 - P D 1 - Over Rg N 1 - for yrène	: 606 Im : 24 obov-cy Jus	Compac 24 71-fus : inc	cită	: I1 - 11 -C

AMMET.: 1398
HOM Doight du neigne MADLACHMANN. 4 R4881.85

iche	ubre yeux	Débou début	ur mant mi/deb	Phro quap	Forti- lité	Tho dabat	raison mi/E		Vê debût	raison mi/v	Tin	matur It.6
ただけで	13 10 10 -57			02122-7	Couleu Saveur	disces disces E : B-0	311 G - H ph-ell G -Rs- m - a	.l : - Pov-o Rg-N or - f	Dim: bov-cy dus ox - h	l-fus : inc erb		17.9 F +5 : 1 ::- C

Désignation : Emplacement : Joight derneigne 4.7A60.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé de vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses Oduveteuses O- cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 6 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Caloro 69

Désignation Poight du neigne Emplacement : 4-7-A6A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 62 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite δ - femelle 5.

-Calvo 77

Désignation : Emplacement : Doight du neigrae 4.7A6+12

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré (7 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 3 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair O base 52 - vrille rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Joight du neigne 4,7 A 6 3,2

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - potite 1 - noyonne (2) grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 6 - veleuté 6 -35 aranéeux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9 Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5) Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournenté (5) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Coulcur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabro (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. - Calvo 69

Doight du neigne 4.7 Ab (s-1-2-3) Nº d'ordre Désignation : Emplacement : 24 - Grosse (1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 24 - Lâche (4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse (1)- Grosse (2)- Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 26 × 22). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre ()- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8 } apyrène 9. 31 - A pédicelle long ()- moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - h bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 / long 6, 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

Doight du neigne 4.7A6 (s. D2.3)

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
ni Désignation: Doight du neigne
 No d'ordre :
Origine :
Emplacement: dupl7 A6 p 1-2-3 + de s4-5
                                      poles 80
8 - Angle des nervures ..... 0-2-3.
9 - L<sub>1</sub>/L .... 0-3-3.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 -(2) -(3).
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2)- 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                         : (1) - (2) - 3.
                 Direction
                           : (4)-(5)
                 Médiane/Base : 6 - (7)- (8)
```